

Терегулова З.С

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» МЗ РФ,
д. м. н. профессор консультативно-методического центра «Эндоэкологическая медицина», Уфа

Оценка эффективности препаратов серии PowerMatrix детоксикационной направленности у жителей мегаполиса (г.Уфа), в возрасте от 38 до 40 лет на фоне применения препаратов PowerMatrix производился согласно, рекомендациям производителя, а именно: MatrixRelictum по 6 капель 3 раза в день на 100 мл питьевой воды и MatrixAnGel по 15–20 капель на 0,5 л питьевой воды с приемом в течение дня.

По результатам мониторинга в течение 1,5 месяцев на фоне приема изучаемых препаратов через 10–14 дней от начала их применения на фоне ошелачивающей диеты, наблюдалось уменьшение номенклатуры токсинов в организме на фоне явной динамики общего улучшения состояния пациентов. В 46,7% случаях отмечено клиническое улучшение со стороны кожных проявлений аллергии. Показатели гемограммы у большинства наблюдаемых свидетельствовали о снижении количества эозинофилов. Стрессоустойчивость и работоспособность увеличилась у 13 (86,7%) чел.; ритм сна восстановился у 11 (73,3%) чел.

К концу наблюдения, т. е. через 40–45 дней приема данных препаратов, было констатировано признаки исчезновения аллергических проявлений у 11 человек (73,3%) чел, у 2-х — слабовыраженная положительная динамика, у 2-х — без изменений.

Таким образом, продукция серии PowerMatrix перспективна для системного оздоровления организма человека и позволяет управлять рисками развития различных заболеваний в условиях экологического неблагополучия.

Русских О.Е.

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ,
зав. кафедрой фтизиатрии, д.м.н., доцент, г. Ижевск

Оценка возможности повышения эффективности лечения больных с иммунодефицитами с применением препаратов PowerMatrix у пациентов с диагнозом ВИЧ 4-ой стадии с сопутствующей патологией (вирусный гепатит С).

Методика применения. На первом этапе в лечении больных ВИЧ для поддержки функции печени назначался препарат MatrixRelictum перед завтраком по 6 капель на стакан теплой воды и MatrixНераг по 5 капель 3 раза в день на весь период 6-ти месячного лечения,

На 2-м этапе назначались препараты для коррекции иммунного статуса через тимус: MatrixThymon1 по 5 капель 3 раза в день в течение 3-х месяцев с последующим переходом на препарат MatrixThymon2 в той же дозировке и курсе применения с целью устранения уже возможных аутоиммунных нарушений.

На заключительном 3-м этапе восстановления осуществлялось применение препарата MatrixSalutem в дозировке по 5 капель совместно с приемом препарата MatrixRelictum по 6 капель на стакан теплой воды 2 раза в день, но не позднее 6 часов вечера. Все больные полностью прошли полный курс ХП туберкулеза без прерывания лечения, что является важным моментом в алгоритме терапии.

Результаты. При оценке эффективности курсового лечения на фоне применения химиопрофилактики туберкулеза и антиретровирусной терапии в сочетании с изучаемыми препаратами PowerMatrix в течение 6 месяцев констатирована позитивная динамика маркеров иммунодефицита. В иммунограммах фиксировалось повышение исходного пониженного уровней СД-4 лимфоцитов в 2 раза у 3-х б-х (60%), в 1,5 раза у 1 б-го (20%), без изменений у 1 б-го (20%) на фоне приверженности к лечению у всех 5 б-х (100%), то есть по завершению полного курса химиопрофилактики туберкулеза. Комплексное

лечение с применением продукции PowerMatrix у больных ВИЧи, прошедших курс химиопрофилактики туберкулеза и антиретровирусной терапии в течение 6 месяцев позволило избежать развития нежелательных реакций на химические препараты, улучшить биохимические показатели печени по данным (АЛТ, АСТ и щелочная фосфатаза) у 4 б-х (80%), повысить уровень СД-4 лимфоцитов и переносимость медикаментозной терапии,

Таким образом, включение препаратов PowerMatrix патогенетически обосновано и эффективно у больных ВИЧи в комплексной специфической терапии.

Лисун Н.Ф.

врач-эксперт высшей категории, Киров.

Оценка эффективности применения аппаратов «PowerMatrix» у пациентов с бронхиальной астмой.

Пациентка С., 05.01.1948г.р. *Диагноз: бронхиальная астма смешанного генеза, тяжёлое персистирующее течение, бронхоэктатическая болезнь, гепатит «С».* Базовая терапия: Беродуал, Симбикорт, Преднизалон. Длительность заболевания: 29 лет.

Пациентка К. 17.05.1944 г.р. *Диагноз: Бронхиальная астма, неаллергическая, средней степени тяжести. Сахарный диабет II типа.* Базовая терапия: Сальбутамол, Бератек, Симбикорт, Фликсотит. Длительность заболевания: 10 лет.

Пациентка К., 09.06.1941 г.р. *Диагноз: Бронхиальная астма смешанного генеза, Гипертоническая болезнь III.* Длительность заболевания: 10 лет.

Пациентка К., 16.08.1951 г.р. *Диагноз: Бронхиальная астма атопического генеза, персистирующая, Хронический аллергический ринит.* Базовая терапия: Тафен-новолайзер, Фликсотит, Беклазон, Сальбутамол. Длительность заболевания: 15 лет.

Пациентка Л., 02.12.194 г.р.. *Диагноз: Бронхиальная астма смешанная, персистирующая, Вторичная иммунная недостаточность.* На момент исследования принимала 18 лекарственных препаратов. Длительность заболевания: 20 лет.

Пациентка Щ. ,30.05.1951г.р. *Диагноз: Бронхиальная астма эндогенная, персистирующая.* Базовая терапия: Сальбутамол, Фликсотит, Беклазон, Атровент, Беродуал. Длительность заболевания: 12 лет.

Пациентка Ф. 21.05.1976г.р. *Диагноз: Бронхиальная астма эндогенная, кашлевой вариант, хронический ринит, фарингомикоз.* Базовая терапия: Ингаляционные глюкокортикоиды, Флутиказон, Будесонит, Бекламетазон. Длительность заболевания: 1 год.

Методика применения препаратов «PowerMatrix»: Matrix Splenum, Matrix Nem, Matrix Pnevma, Matrix Thymos-2, Matrix Oxynorm каждого последовательно по 5 капель на ст. л. воды 3 раза в день и Matrix Salutem 5 капель под язык 2-3 раза в день до 18 час. Дополнительно рекомендовались ультразвуковые ингаляции с препаратами Pnevma, Salutem, Thymos-2 по 6капель на 2 мл физиологического раствора. Курсом 1 год с осуществлением мониторинга с помощью прибора «ROFES»,

Результаты. Минимизация обострений, купирование приступов удушья – 7 человек (100%); восстановление функции дыхания – 5 человек (71%); у меньшеение аллергического фона – 4

человека (57%); минимизация лекарственной нагрузки – 7 человек (100%); восстановление работоспособности, сна – 7 человек (100%); укрепление стрессоустойчивости – 7 человек (100%);